



International Parkinson and
Movement Disorder Society

টিক্স এবং টোরেটি সিনড্রোমঃ রোগীদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তথ্যবলি

টিক্স কি?

টিক্স হলো এক ধরণের নড়াচড়া যা রোগীরা সবসময় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এ ধরণের নড়াচড়া করার জন্যে রোগীদের প্রায়ই একটি ইচ্ছা বা অভিপ্রায় জাগে যা নড়াচড়া করার পর দমন হয়। নড়াচড়া কখনও অল্প সময়ের জন্য বন্ধ রাখা যেতে পারে।

টিক্স হতে পারে :

- হাঁঠ, দ্রুত
- পুনরাবৃত্তিমূলক এবং বাঁধাধরা (প্রতিটি সময় একই রকম)
- উদ্দেশ্যহীন বা ছন্দহীন
- এগুলো সাধারণ বা জটিল হতে পারে

সাধারণ টিক্স হাঁঠ দেখা দেয় এবং সাধারণত সগুহ বা মাসব্যাপী থাকে। সাধারণ মোটর টিক্স যা সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় তা হল: চোখের পাতা বার বার বন্ধ করা, ক্রুঁচকানো, কাঁধ উঠানো (Shrugging), মাথা এবং ঘাড় বাঁকানো বা কাঁপানো। সাধারণ কষ্টস্বর টিক্সগুলো হচ্ছে: গলা কাকানি, কাশি, নাক টানা এবং হাই তোলা।

জটিল মোটর টিক্স এ উদ্দেশ্যপূর্ণ নড়াচড়া হয় যেমন: মুখ ভঙ্গী করা, টোকা মারা (tapping), একটি নির্দিষ্ট ভঙ্গিমায় হাঁটা বা চক্রকারে ঘুরা, লাফালাফি, লাথি মারা, ঘুষি মারা। জটিল কষ্টস্বর টিক্সগুলো হচ্ছে: মুখে বিভিন্ন শব্দ করা, শব্দগুচ্ছ, শব্দ বা বাক্যাংশ পুনরাবৃত্তি করা (ইকোলালিয়া); খুব কম ব্যবহৃত বা সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ শব্দ বা বাক্যাংশ বলা (coprolalia)।

টোরেটি সিনড্রোম কি?

টোরেটি সিনড্রোম (TS), যা গিলেস ডি লা টোরেটি সিনড্রোম নামেও পরিচিত, এটি একটি ব্যাধি যা সাধারণত চার থেকে ছয় বছর বয়সের মধ্যে শুরু হয় এবং দশ থেকে বার বছরের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর হয়। সংজ্ঞানুসারে টিক্স অবশ্যই আঠারো বছরের আগে শুরু হতে হবে। টোরেটি সিনড্রোম নারীদের তুলনায় পুরুষের বেশী হয়। টোরেটি সিনড্রোম রোগীদের মোটর এবং কষ্ট টিক্স একত্রে হয়, সেটা সহজ বা জটিল ধরণের টিক্স হতে পারে এবং অবশ্যই এক বছরেরও বেশি সময় ধরে হতে হবে। আচরণগত সমস্যা যার মধ্যে রয়েছে উদ্বেগ এবং শুচিবাই (Obsessive compulsive behavior) দেখা যেতে পারে।

টিক্স এবং টোরেটি সিনড্রোম এর কারণ কি?

টিক্স এবং টোরেটি সিনড্রোম এর কারণ অজানা। টিক্স এবং টোরেটি সিনড্রোম প্রায়ই বংশগত কারনে হয় অর্থাৎ পরিবারে বংশপরম্পরায় হতে পারে।

সব টিক্স কি টোরেটি সিনড্রোম হয়?

টিক্স থাকা সব মানুষের টোরেটি সিনড্রোম থাকে না। টোরেটি সিনড্রোম নির্ণয়ের জন্য অন্য একটি কষ্ট টিক সহ একাধিক টিক এক বছর এর বেশি সময় ধরে থাকা প্রয়োজন। যদিও টিক্স বেশি হয়, টিক্স একটা সময়ে পাঁচজন শিশুর মধ্যে একজনের হতে পারে, টোরেটি সিনড্রোম অনেক কম হয়।

চিকিৎসা আছে কি?

প্রায়ই টিক্স এর কোন চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। মোটর টিক্স, কষ্টস্বর টিক্স এবং টিএস এর চিকিৎসা নির্ভর করে কিভাবে টিক্স রোগীদের প্রভাবিত করে এবং এদের কোন সামাজিক বা মানসিক প্রভাব আছে কি না। টিক্স যদি অনেক কষ্ট বা দৈনন্দিন কার্যকলাপের ব্যাধাত না ঘটায়; রোগীর শুধুমাত্র ভালো সমর্থন (Support), শিক্ষা এবং আশ্বাস প্রয়োজন হয়। রোগীর চারপাশের মানুষকে রোগ সম্পর্কে সচেতন করলে রোগীর বৌঝাপড়া বাড়তে এবং সামাজিক কলঙ্ক কমাতে পারে। ডাঙ্কার, মনোবিজ্ঞানী এবং সামাজিক কর্মী এ কাজে সহায়তা করতে পারে। পরিবারের সদস্যগণ এবং শিক্ষকগণকে অবশ্যই জানতে হবে কিভাবে টিক্স অনিয়ন্ত্রিত হয় যাতে তারা রোগ নির্ণয় বুঝতে পারেন এবং শিশুর আত্মস্মানবোধহীনতা এড়াতে পারেন।

রোগীদের চিকিৎসার জন্য ডাঙ্কারের পরামর্শ করা উচিত, যদি টিক্স থাকে:

- রোগ যদি মারাত্মক ভোগান্তির কারণ হয়
- স্কুল বা দৈনন্দিন কাজে ব্যাধাতের কারণ হয়
- সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, দাঙ্গা বা বিষম্বনাতার কারণ হয়

ব্যাপক আচরণ পরিবর্তন জনিত হস্তক্ষেপ চিকিৎসা (CBIT) টোরেটি সিনড্রোম রোগীদেরকে ব্যবহার করা যায়। CBIT এক ধরণের সচেতনতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ এবং টিক মুভমেন্ট করার ইচ্ছা জাগ্রত হওয়াকে রোধ করার জন্য এক ধরণের থেরাপি।

যদি শুধু আচরণ থেরাপি সফল না হয়, কিছু ঔষধ সহায়ক হতে পারে। ঔষধগুলোর কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে, তাই রোগীদেরকে তাদের ডাঙ্কারের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। ঔষধগুলো হলো: ক্লোনিডিন (Clonidine) এবং গুনাইফেসিন(Gunaifacine), ক্লোনাজেপাম (Clonazepam) বা অন্যান্য উদ্বেগ কমানোর ঔষধ (বিশেষ করে রোগীর যদি উদ্বেগ থাকে) এবং এন্টিসাইকোটিক ঔষধ (যদিও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বিবেচনায় রাখতে হবে)। উপরোক্ত, যে সব রোগী ঔষধে ভালো হবেনা তাদের জন্য গভীর মাত্তিক্ষেপ উদ্বৃত্তি সার্জারি করা যেতে পারে।

কেন টোরেটি সিনড্রোম কে একটি নিউরো-সাইকিয়াট্রিক ডিজঅর্ডার বিবেচনা করা হয়?

নিউরো-সাইকিয়াট্রিক রোগ স্নায়সংক্রান্ত রোগ যা আচরণকে প্রভাবিত করে। টোরেটি সিনড্রোম রোগীদের ৫০% এরও বেশি আচরণগত সমস্যা যেমন মনোযোগের ঘাটতি জনিত হাইপারএক্টিভ ডিজঅর্ডার (ADHD) এবং শুচিবাই (OCD) থাকে। এছাড়াও রোগীদের বিষম্বনা, আবেগপ্রবণ আচরণ, ব্যক্তিত্বজনিত রোগ, নিজে নিজেকে ক্ষতি (self harm) এবং ঘুমজনিত সমস্যা উভে হতে পারে। এই রোগ গুলোর চিকিৎসা আছে, সুতরাং ডাঙ্কার সঙ্গে কথা বলুন।

টিক্স বা টোরেটি সিনড্রোম রোগীরা কি আশা করতে পারেন?

টিক্স প্রায়ই অস্থায়ী। অনেক ক্ষেত্রেই টিক্স এবং টোরেটি সিনড্রোম বয়স বাড়ার সাথে সাথে কমতে থাকে, প্রাপ্ত বয়স্ক জীবনে সম্পূর্ণভাবে অদ্শ্য হয়ে যায়।



মূল: ইন্টারন্যাশনাল পার্কিনসন এন্ড মুভমেন্ট ডিজঅর্ডার সোসাইটি

বঙ্গানুবাদ ও প্রকাশনায়: মুভমেন্ট ডিজঅর্ডার সোসাইটি অফ বাংলাদেশ